



## УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Идеал-Д»

Копылова Д.Ш.

## ИНФОРМАЦИЯ

**О ПРАВИЛАХ И УСЛОВИЯХ ЭФФЕКТИВНОГО И БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАБОТ И УСЛУГ, СРОКЕ СЛУЖБЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, А ТАКЖЕ НЕОБХОДИМЫХ ДЕЙСТВИЯХ ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКОВ СЛУЖБЫ И ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ ПРИ НЕВЫПОЛНЕНИИ ТАКИХ ДЕЙСТВИЙ, ЕСЛИ ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКОВ ВОЗНИКАЕТ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЯ И ИМУЩЕСТВА ИЛИ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ СТАНОВЯТСЯ НЕПРИГОДНЫМИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ**

Стоматологические услуги по терапевтической стоматологии

№ п/ п	Результат оказания услуг, выполнения работ	Правила и условия эффективного и безопасного использования	Установленн ый срок службы на результат	Необходимые действия по истечении срока службы	Возможные последствия невыполнения действий по истечении срока службы
1	Пломба из цемента стеклоиономерног о/ Пломба из композита светового отверждения	Во избежание сколов пломбы и прилегающих к пломбе твердых тканей зуба не рекомендуется принимать и пережевывать очень жесткую пищу (например: орехи, сухари), откусывать от больших кусков (например: от цельного яблока).	2 года	Раз в полгода посещение стоматолога для проведения профилактических осмотров и необходимых манипуляций (при пломбах из композитных материалов — для полировки пломбы, что увеличит срок её службы).	Появление на ней и в ней микроповреждений (и микропор), неизбежное со временем, способствует скоплению патогенных бактерий, их размножению, возникновению повторного заболевания. Поэтому старые пломбы по истечении срока службы желательно заменить на новые.

Стоматологические услуги по ортопедической стоматологии

1	Вкладки	<ul style="list-style-type: none"> <li>- домашняя гигиена 2 раза в день</li> <li>- профосмотры и гигиена в клинике 1 раз в 6 месяцев</li> <li>- обращайтесь с восстановленным зубом, как с натуральным: не грызите орехи в скорлупе, не открывайте зубами крышки и т.д.</li> </ul>	2 года	<p>Раз в полгода посещение стоматолога для проведения профилактических осмотров.</p>	<p>Расшатывание штифта - происходит из-за рассыхания композита или нарушения рекомендаций. Стоматолог повторно фиксирует штифтовую часть на цемент, при сильном расшатывании может потребоваться новая конструкция.</p> <p>Ломается корневая часть, необходимо</p>
---	---------	--	--------	--	--

					срочно обратится к врачу, не пытайтесь самостоятельно зафиксировать! Стоматолог удалит отломанный кусок, фиксирует новую конструкцию.
2	Съемные протезы постоянные	<p>Нельзя допускать пересыхания протеза. При этом нарушается структура полимерного материала и конструкция деформируется. Беречь конструкцию от механических повреждений. Нельзя сильно сжимать зубы, откусывать от твердых фруктов. Полностью исключить орехи, семечки и сухарики – съемная конструкция не предназначена для таких серьезных нагрузок.</p> <p>Если прилегание ортопедической конструкции нарушилось, но при этом она не повреждена, срок ношения может продлить перебазировка протеза.</p>	1-2 года	<p>Соблюдать правила гигиены. Пользоваться специальными средствами ухода, которые сократят количество бактерий на конструкции. Регулярно посещать врача. Периодичность визитов при ношении съемных конструкций – раз в 6 месяцев.</p>	Изделие теряет прочность и меняет форму, что может привести к раздражению десен и постоянному чувству дискомфорта в ротовой полости.
3	Мостовидные протезы из металлокерамики / безметалловые	Чтобы полноценно ухаживать за полостью рта и несъемными	1-2 года	1-2 раза в год рекомендуется приходить на прием к	- Край коронки виден из-под десны (оголение корня свидетельствует о

	(керамика/ цирконий)	зубными протезами необходимо (удобная щетка с мягкой щетиной; хорошая зубная паста; зубная нить; однорядная межзубная щетка- ершик; специальные жидкости для полоскания ротовой полости; ирригатор. Для сохранности протеза не рекомендуется грызть или жевать продукты, имеющие твёрдую и жесткую консистенцию, такие как сухари, орехи, лед, леденцы и т.п. Не следует поправлять и ремонтировать протезы собственными силами, так как это приведет к его смещению и поломке		стоматологу, чтобы отполировать мостовидный протез и удалить скопившиеся отложения и бактериальный налет.	рецессии десны. Это может стать началом развития кариеса и разрушения зуба) - Наличие воспаления. (кровоточивость десен, припухлости и неприятные ощущения в месте реставрированного зуба – повод обратиться к врачу). - Ощущение нестабильности протеза. («причавкивание» коронки во время еды говорит о том, что цемент утратил свои способности, конструкция потеряла прочность). - Неприятный запах изо рта. (признак гнилостного процесса вследствие жизнедеятельности бактерий). - Пища застревает между зубом и протезом. Такое состояние считается аномальным и чревато воспалением.
4	Бюгельное протезирование	-после каждого приема пищи нужно промывать протез в мыльной воде; -раз в день протез погружают в дезинфицирующий раствор на 5–10 минут. -каждую неделю протез нужно обрабатывать биораствором, который удалит застарелые остатки пищи и грязи, которые вы могли пропустить при рядовой чистке. -протез необходимо хранить в специальном футляре с водой.	2 года	Два раза в год посещать стоматолога- ортопеда и проходить плановый осмотр. Это необходимо, чтобы вовремя отследить возможную реакцию полости рта на протез.	Использование любого протеза (в том числе бюгельного) может привести к атрофии слизистой и костной ткани, и в результате протез уже не может плотно прилегать к десне. Если протез хранится неправильно, если вы плохо его чистите, то он может стать причиной воспаления десен. На плановом осмотре врач заметит проблему на ранней стадии и сможет отправить вас к стоматологу- терапевту для лечения пародонта.
5	Коронки из	-чистить зубы	3 месяца	Посещать	-воспалению десен;

	пластмассы длительного ношения	аккуратно, без резких движений или чрезмерного давления; - после использования зубной нити, удалять ее аккуратно — двумя пальцами, натягивая концы вниз; - исключить употребление твердых или липких продуктов; -минимизировать жевательную нагрузку на стороне протезирования; -если конструкция сместилась или была повреждена, нужно как можно скорее обратиться к врачу; -нельзя носить коронки дольше срока, указанного стоматологом.		стоматолога-ортопеда и проходить плановый осмотр. Временные ортопедические коронки заменить постоянными конструкциями.	-кариозное поражение культи; -нагноению тканей; -травмам из-за сколов.
6	Коронки из металлокерамики/ безметалловые (керамика, циркония)	Зубы чистить утром и вечером, и после каждого приема пищи, если чистка в течение дня невозможна, можно ограничиться полосканием специальным раствором, который приобретается в аптеке. Дополнительным средством гигиены по уходу за коронками и мостовидными протезами является ирригатор. Из рациона по	3 года	Раз в полгода посещение стоматолога для проведения профилактических осмотров и профессиональной гигиены полости рта.	-разрушается опора, на которой закреплен протез. Обычно к этому приводит развитие кариеса. Оставшаяся часть зуба постепенно отмирает, и коронки теряют прочность фиксации. -воспаляются мягкие ткани, контактирующие с коронкой. Десны краснеют и отекают, возникает болезненность при прикосновении к ним. Часто это связано с постепенным

		<p>возможности исключаются крепкий чай и кофе, которые могут спровоцировать появление темного налета на поверхности коронок.</p> <p>Не допускаются слишком холодные или чересчур горячие блюда и напитки, недопустимы также перепады температур, чреватые трещинами на поверхности изделий.</p> <p>Запрещены чрезмерные нагрузки на протезы: чересчур твердая пища, раскалывание скорлупы орехов, откупоривание зубами бутылок и т.п. В случае появления трещин или сколов ремонт коронки должен производить специалист.</p> <p>Ограничиваются сладости (шоколад, мед, сахар).</p>			<p>изменением формы протеза и его износом.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оголяются корни и под коронкой начинают застревать кусочки пищи. Подобная ситуация не только причиняет дискомфорт, но и может спровоцировать инфицирование десны и воспаление тканей.</li> </ul>
7	Протезирование постоянное с опорой на имплантатах (металлокерамика / цирконий)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- гигиена два раза в день обычной зубной щеткой мягкой или средней жесткости, для удаления оставшихся частичек пищи использовать ирригатор.</li> <li>- желательно чистить зубы после</li> </ul>	3 года	<p>Раз в пол года посещение стоматолога для проведения профилактических осмотров и возможного выявления различных отклонений в ротовой полости на ранних стадиях.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-неожиданно возникшая боль, повышенная температура тела, озноб;</li> <li>-онемение челюстно-лицевой области, которого ранее не было;</li> <li>-при надавливании на импланты возникают неприятные</li> </ul>

	<p>каждого приема пищи.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Использование ополаскивателя для полости рта.</li> </ul> <p>При отсутствии должного ухода активно накапливается зубной камень и налет, это ведет к риску воспаления кости вокруг титанового стержня.</p>		<p>Проверка состояния протезов на имплантах, их положение, наклон, выявление показаний для перепротезирования.</p> <p>Раз в 6-12 месяцев профессиональная гигиена полости рта.</p>	<p>ощущения или резкая боль;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-появилось покраснение десны, отечность слизистой, неприятный запах изо рта;</li> <li>-возникла боль в области височно-челюстного сустава, затруднительно двигать нижней челюстью, она хрустит или не открывается/не закрывается;</li> <li>-зубы не смыкаются (по всей длине зубного ряда или только с одной из сторон), появилось ощущение смещения протеза;</li> <li>-протез стал подвижным, произошел скол части зубов;</li> <li>больно жевать на какой-то одной стороне или пользоваться всеми зубами.</li> </ul>
--	---	--	--	---

#### Стоматологические услуги по дентальной имплантации

1	Дентальная имплантация	<p>-после имплантации следует употреблять мягкую или перетёртую твёрдую пищу. Еда не должна быть слишком горячей или слишком холодной. Пережёвывать зубными имплантами пищу первые три дня запрещается.</p> <p>-во время чистки зубов нужно избегать области имплантации,</p>	3 года	<p>- профессиональная гигиена полости рта не менее 2-х раз в год</p> <p>- регулярные профилактические осмотры у стоматолога</p> <p>Титановые корни могут прослужить всю жизнь, но на срок службы имплантата влияет комплекс общих и местных</p>	<p>-воспаление тканей, окружающих имплант.</p> <p>-отторжение, которое выражается в подвижности имплантата.</p> <p>- травма, которая привела к появлению подвижности конструкции, ее смещению и другим изменениям.</p>
---	------------------------	---	--------	---	--

	<p>чтобы не нанести механической травмы.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-хотя бы первые три дня после имплантации исключить курение.</li> <li>Исключить алкоголь.</li> <li>-после каждого приёма пищи производить ополаскивание зубов антисептическим раствором.</li> <li>-щадительно удалять остатки пищи между зубами с применением специальных щёток или зубной нити.</li> <li>-после имплантации зубов следует в обязательном порядке исключить физические нагрузки, авиаперелёты.</li> <li>-не допускать перегрева или переохлаждения после имплантации.</li> <li>-обязательно явиться на осмотр зубов к имплантологу.</li> <li>-при увеличении опухоли и сильной зубной боли немедленно обратиться к врачу.</li> </ul>		<p>факторов, многое зависит от состояния организма человека, приобретенных патологий, которые могут разрушать соединительные ткани, ухудшать процесс остеоинтеграции. Онкология, сахарный диабет, болезни крови меняют клиническую картину, являются причиной осложнений или отторжения конструкции.</p>	
--	--	--	--	--

#### Стоматологические услуги по ортодонтической стоматологии

1	Несъемные ретейнер	<ul style="list-style-type: none"> <li>- гигиена два раза в день</li> <li>- использовать ирригатор</li> <li>- для чистки межзубных</li> </ul>	6 месяцев	<ul style="list-style-type: none"> <li>- профилактические осмотры не реже 2-6 месяцев</li> <li>- рекомендовано проведение</li> </ul>	Если ретейнер отклеился, нужно посетить ортодонта и вернуть его на место, чтобы не случился
---	--------------------	---	-----------	--	---

		промежутков лучше использовать специальную зубную нить «Супер- флюс»		профессиональной гигиены 1 раз в 6 месяцев. -по истечению срока службы замена на новый несъемный ретейнер по необходимости или снятие и замена на съемную ретенционную капа	ортодонтический рецидив
2	Каппа ретенционная	-аккуратное обращение с ретенционной капой (нельзя сжимать и использовать не по назначению) -чистить ретенционную капу при помощи зубной щетки и пасты под проточной водой -нельзя обрабатывать капу кипятком или сильнодействующими растворами :это приводит к необратимой деформации и поломке капы -во время приема пищи, для избежания поломки, капу необходимо снимать -хранить капу в специальном контейнере	6 месяцев	- профилактические осмотры не реже 2-6 месяцев -по истечению срока службы при необходимости замена на новую	-процесс лечения может дать вам обратный ход, возвращая постепенно то положение зубов и соотношение верхней и нижней челюсти, которое было прежде (до лечения).
3	Брекет-системы	- гигиена два раза в день (ортодонтическая щетка+монопучковая щетка) - зубная нить для пациентов с брекет-системой	1-2 года или до снятия брекет-системы	Снятие брекет системы и фиксация ретейнера или изготовление ретенционной каппы	- зубы начнут регressiveвное движение. При этом перемещение будет осуществляться беспорядочным образом, так как не будет силы,

	<p>(Суперфлосс)      -набор ершиков      (ершики      необходимо менять      регулярно не менее      чем 1 раз в неделю)      Исключить:      твердые продукты,      они могут      повредить части      брекет-системы,      липкие, вязкие      продукты      способствуют      ретенции налета на      зубах и брекетах.      Употребление      красящих веществ      может привести к      окрашиванию      участков эмали на      границе с      брекетами.</p>			<p>задающей      определенную      направленность.</p>
--	--	--	--	--